

## Оксалиплатин / Лейковорин / 5FU (OFF) ХС752 (сутки 8, 22) (европейский протокол) Рак поджелудочной железы и холангиоцеллюлярная карцинома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15, 22	Кальция фолинат	200	0,9% NaCl	250 мл	2 часа	внутривенно
8, 22	Оксалиплатин	85	5% Глюкоза	500 мл	2 часа	внутривенно
1, 8, 15, 22	Флюороурацил	2000	0,9% NaCl	1000 мл	24 часа	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>Кальция фолинат</b>																																
							■								■																	
<b>Оксалиплатин</b>																																
							■																									
<b>Флюороурацил</b>																																
■							■								■																	

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
43 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

Количество циклов: пока заболевание прогрессирует.  
(\* Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.  
Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)  
(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).  
Последнее изменение содержания: январь 2016 г.  
Литература:  
Pelzer U. et al., Onkologie 32: 99ff, 2009.

