

Гемцитабин / Цисплатин ХС592 (европейский протокол) Рак поджелудочной железы и холангиоцеллюлярная карцинома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1, 8	Гемцитабин	1000	0,9% NaCl	500	30 минут	внутривенно
1, 8	Цисплатин	25	0,9% NaCl	500	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Гемцитабин																												
■							■																					
Цисплатин																												
■							■																					

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
8

Примечание:

Режим в случае холангиоцеллюлярного рака.
Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 250 мл 20% раствора Маннита
либо 40 мг Фуросемида внутривенно;

Постмедикация: 1000 мл 0,9% раствора NaCl
внутривенно и электролитный баланс.

Литература:

Valle J.W., Br J Cancer 101: 621ff, 2009.

