

Гемцитабин / Цисплатин ХС592 (европейский протокол) Рак поджелудочной железы и холангиоцеллюлярная карцинома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8	Гемцитабин	1000	0,9% NaCl	500 мл	30 минут	внутривенно
1, 8	Цисплатин	25	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Гемцитабин																												
Цисплатин																												

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
29 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
8**

Примечание:

Режим в случае холангиоцеллюлярного рака.

Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 250 мл 20% раствора Маннита либо 40 мг Фуросемида внутривенно;

Постмедикация: 1000 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно и электролитный баланс.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Valle J.W., Br J Cancer 101: 621ff, 2009.

