

## 5FU / Лейковорин ХА149 (европейский протокол) Колоректальный рак

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1, 2, 15, 16	Кальция фолинат	200	0,9% NaCl	250	2 часа	внутривенно
1, 2, 15, 16	Флуороурацил	400	-	0	Болюс	внутривенно
1, 2, 15, 16	Флуороурацил	600	0,9% NaCl	500	22 часа	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Кальция фолинат</b>																												
█	█														█	█												
<b>Флуороурацил</b>																												
█	█														█	█												
<b>Флуороурацил</b>																												
█	█														█	█												

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

**Примечание:**

(\*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.

**Литература:**

De Gramont A. et al., J Clin Oncol 15: 808ff, 1997.

