

5FU / Лейковорин ХА149 (европейский протокол) Колоректальный рак

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 2, 15, 16	Кальция фолинат	200	0,9% NaCl	250 мл	2 часа	внутривенно
1, 2, 15, 16	Флюороурацил	600	0,9% NaCl	500 мл	22 часа	внутривенно
1, 2, 15, 16	Флюороурацил	400	-	0	Болюс	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Кальция фолинат																												
■	■													■	■													
Флюороурацил																												
■	■													■	■													
Флюороурацил																												
■	■													■	■													

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

(*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)
(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

De Gramont A. et al., J Clin Oncol 15: 808ff, 1997.

