

5FU / Лейковорин ХА149 (европейский протокол) Колоректальный рак

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м ² | Растворитель | Объем (мл) | Время введения | Путь введения |
|--------------|------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 1, 2, 15, 16 | Кальция фолинат | 200 | 0,9% NaCl | 250 | 2 часа | внутривенно |
| 1, 2, 15, 16 | Флуороурацил | 400 | - | 0 | Болюс | внутривенно |
| 1, 2, 15, 16 | Флуороурацил | 600 | 0,9% NaCl | 500 | 22 часа | внутривенно |

График введения препаратов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Кальция фолинат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Флуороурацил | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Флуороурацил | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

(*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.

Литература:

De Gramont A. et al., J Clin Oncol 15: 808ff, 1997.

