

**5FU / Лейковорин / Иринотекан (FOLFIRI) + Бевацизумаб XC572 + ХА060 (европейский протокол) Колоректальный рак**

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 15	Бевацизумаб	5 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	90 минут	внутривенно
1, 15	Иринотекан	180	0,9% NaCl	500 мл	90 минут	внутривенно
1, 2, 15, 16	Кальция фолинат	200	0,9% NaCl	250 мл	2 часа	внутривенно
1, 2, 15, 16	Флюороурацил	600	0,9% NaCl	500 мл	22 часа	внутривенно
1, 2, 15, 16	Флюороурацил	400	-	0	Болюс	внутривенно

**График введения препаратов:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Бевацизумаб</b>																												
█														█														
<b>Иринотекан</b>																												
█														█														
<b>Кальция фолинат</b>																												
█	█													█	█													
<b>Флюороурацил</b>																												
█	█													█	█													
<b>Флюороурацил</b>																												
█	█													█	█													

**Дополнительная информация**

**Примечание:**

Обратите внимание! В данной схеме Флюороурацил назначается дважды разными дозировками и временем введения:

- Флюороурацил 400 мг/м<sup>2</sup> вводится внутривенно болюсно;
- Флюороурацил 600 мг/м<sup>2</sup> вводится внутривенно 22 часа.

Из-за особенностей функционала нашей онлайн-платформы, сумма по Флюороурацилу, который вводится болюсно, не отображается в таблице, но учитывается в общей стоимости за цикл.

Внимание! Иринотекан может вызвать опасную для жизни диарею и холинергический синдром. Диарея может возникнуть либо в острой форме, либо в некоторые дни после введения Иринотекана.

Сопутствующая медикация: Атропин 0,2 мг подкожно или внутривенно.

В случае диареи: Лоперамид, сначала 4 мг, затем по 2 мг каждые 2 часа. Прием Лоперамида следует продолжать еще в течение 12 часов после прекращения диареи.

Если она сохраняется более 48 часов или в случае лихорадки, рекомендовано назначение Ципрофлоксацина и госпитализация.

(\*). Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.

(\*). Бевацизумаб: Начальную дозу вводят в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии, вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

**Литература:**

Hurwing H. et al., N Engl J Med 350: 2335ff, 2004.

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

