ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

# 5FU / Лейковорин / Оксалиплатин (FOLFOX IV) + Бевацизумаб XC588 + XA060 (европейский протокол) Колоректальный рак

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м$^2$ | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 15 | Бевацизумаб | 5 мг/кг | 0,9% NaCl | 100 мл | 90 минут | внутривенно |
| 1, 2, 15, 16 | Кальция фолинат | 200 | 0,9% NaCl | 250 мл | 2 часа | внутривенно |
| 1, 15 | Оксалиплатин | 85 | 5% Глюкоза | 500 мл | 2 часа | внутривенно |
| 1, 2, 15, 16 | Флюороурацил | 600 | 0,9% NaCl | 500 мл | 22 часа | внутривенно |
| 1, 2, 15, 16 | Флюороурацил | 400 | - | 0 | Болюс | внутривенно |

**График введения препаратов:**




**Дополнительная информация**

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

**Примечание:**
**(*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.**
**(*) Бевацизумаб: Начальную дозу вводят в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии, вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.**
**Авторы: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).**
**Последнее изменение содержания: январь 2016 г.**
**Литература:**
**Saltz et al., J Clin Oncol 26: 2013ff, 2008.**