

5FU / Лейковорин / Оксалиплатин (FOLFOX IV) + Бевацизумаб ХС588 + ХА060 (европейский протокол) Колоректальный рак

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1, 15	Бевацизумаб	5 мг/кг	0,9% NaCl	100	90 минут	внутривенно
1, 2, 15, 16	Кальция фолинат	200	0,9% NaCl	250	2 часа	внутривенно
1, 15	Оксалиплатин	85	5% Глюкоза	500	2 часа	внутривенно
1, 2, 15, 16	Флюороурацил	400	-	0	Болюс	внутривенно
1, 2, 15, 16	Флюороурацил	600	0,9% NaCl	500	22 часа	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Бевацизумаб																												
■														■														
Кальция фолинат																												
■	■													■	■													
Оксалиплатин																												
■														■														
Флюороурацил																												
■	■													■	■													
Флюороурацил																												
■	■													■	■													

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

(*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.

(*) Бевацизумаб: Начальную дозу вводят в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии, вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.

Литература:

Saltz et al., J Clin Oncol 26: 2013ff, 2008.

