

## 5FU / Лейковорин / Оксалиплатин (FOLFOX IV) + Бевацизумаб ХС588 + ХА060 (европейский протокол) Колоректальный рак

| Дни терапии  | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м <sup>2</sup> | Растворитель | Объем (мл) | Время введения | Путь введения |
|--------------|------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 1, 15        | Бевацизумаб            | 5 мг/кг                      | 0,9% NaCl    | 100        | 90 минут       | внутривенно   |
| 1, 2, 15, 16 | Кальция фолинат        | 200                          | 0,9% NaCl    | 250        | 2 часа         | внутривенно   |
| 1, 15        | Оксалиплатин           | 85                           | 5% Глюкоза   | 500        | 2 часа         | внутривенно   |
| 1, 2, 15, 16 | Флюороурацил           | 400                          | -            | 0          | Болюс          | внутривенно   |
| 1, 2, 15, 16 | Флюороурацил           | 600                          | 0,9% NaCl    | 500        | 22 часа        | внутривенно   |

### График введения препаратов:

| 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>Бевацизумаб</b>     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ■                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Кальция фолинат</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ■                      | ■ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Оксалиплатин</b>    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ■                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Флюороурацил</b>    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ■                      | ■ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Флюороурацил</b>    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ■                      | ■ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

(\*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.

(\*) Бевацизумаб: Начальную дозу вводят в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии, вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.

#### Литература:

Saltz et al., J Clin Oncol 26: 2013ff, 2008.

