

5FU / Лейковорин / Оксалиплатин (FOLFOX IV) + Панитумумаб ХС588 + ХА080 (европейский протокол) Колоректальный рак

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1, 2, 15, 16	Кальция фолинат	200	0,9% NaCl	250	2 часа	внутривенно
1, 15	Оксалиплатин	85	5% Глюкоза	500	2 часа	внутривенно
1, 15	Панитумумаб	6 мг/кг	0,9% NaCl	100	1 час	внутривенно
1, 2, 15, 16	Флюороурацил	600	0,9% NaCl	500	22 часа	внутривенно
1, 2, 15, 16	Флюороурацил	400	-	0	Болюс	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Кальция фолинат																												
■	■													■	■													
Оксалиплатин																												
■														■														
Панитумумаб																												
■														■														
Флюороурацил																												
■	■													■	■													
Флюороурацил																												
■	■													■	■													

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
29 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6**

Примечание:

(*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.

5FU можно вводить при помощи инфузионного насоса амбулаторно.

Панитумумаб >1000 мг растворяют в 150 мл 0,9% раствора NaCl и вводят в течение 90 минут.

В случае хорошей переносимости последующие дозы можно вводить в течение 30 минут.

Литература:

Douillard J.Y. et al., J Clin Oncol 28: 4697ff, 2010.

