

## 5FU / Лейковорин / Оксалиплатин (FOLFOX IV) + Панитумумаб ХС588 + ХА080 (европейский протокол) Колоректальный рак

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 2, 15, 16	Кальция фолинат	200	0,9% NaCl	250 мл	2 часа	внутривенно
1, 15	Оксалиплатин	85	5% Глюкоза	500 мл	2 часа	внутривенно
1, 15	Панитумумаб	6 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	1 час	внутривенно
1, 2, 15, 16	Флюороурацил	600	0,9% NaCl	500 мл	22 часа	внутривенно
1, 2, 15, 16	Флюороурацил	400	-	0	Болюс	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
<b>Кальция фолинат</b>																													
■	■													■	■														
<b>Оксалиплатин</b>																													
■														■															
<b>Панитумумаб</b>																													
■														■															
<b>Флюороурацил</b>																													
■	■													■	■														
<b>Флюороурацил</b>																													
■	■													■	■														

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

(\*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.

5FU можно вводить при помощи инфузионного насоса амбулаторно.

Панитумумаб >1000 мг растворяют в 150 мл 0,9% раствора NaCl и вводят в течение 90 минут.

В случае хорошей переносимости последующие дозы можно вводить в течение 30 минут.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Douillard J.Y. et al., J Clin Oncol 28: 4697ff, 2010.

