

5FU / Лейковорин / Иринотекан (FOLFIRI) + Цетуксимаб ХС572 + ХА070 (европейский протокол) Колоректальный рак

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м ² | Растворитель | Объем (мл) | Время введения | Путь введения |
|--------------|------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 1, 15 | Иринотекан | 180 | 0,9% NaCl | 500 | 90 минут | внутривенно |
| 1, 15 | Кальция фолинат | 400 | 0,9% NaCl | 250 | 2 часа | внутривенно |
| 1, 15 | Флюороурацил | 400 | - | 0 | Болюс | внутривенно |
| 1, 15 | Флюороурацил | 2400 | 0,9% NaCl | 500 | 46 часов | внутривенно |
| 1, 8, 15, 22 | Цетуксимаб | 250 | 0,9% NaCl | 500 | 1 час | внутривенно |

График введения препаратов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Иринотекан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Кальция фолинат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Флюороурацил | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Флюороурацил | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Цетуксимаб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | | |

Дополнительная информация

Примечание:

(*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.

5FU можно вводить при помощи инфузионного насоса амбулаторно.

(*) Цетуксимаб: Первое введение - в течение 120 минут в дозе 400 мг/м² до начала химиотерапии.

Альтернативно можно назначать Цетуксимаб (500 мг/м²) с возможными интервалами в 2 недели (Yuan et al., JCO 27, 2009 suppl, abstr. e15018).

Внимание! Иринотекан может вызвать опасную для жизни диарею и холинергический синдром. Диарея может возникнуть либо в острой форме, либо в некоторые дни после введения Иринотекана.

Сопутствующая медикация: Атропин 0,2 мг подкожно или внутривенно.

В случае диареи: Лоперамид, сначала 4 мг, затем по 2 мг каждые 2 часа.

Прием Лоперамида следует продолжать еще в течение 12 часов после прекращения диареи.

Если она сохраняется более 48 часов или в случае лихорадки, рекомендовано назначение Ципрофлоксацина и госпитализация.

Литература:

Van Cutsem E. et al., N Engl J Med 360: 1408ff, 2009.

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

