

## 5FU / Лейковорин / Иринотекан (FOLFIRI) + Цетуксимаб ХС572 + ХА070 (европейский протокол) Колоректальный рак

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 15	Иринотекан	180	0,9% NaCl	500 мл	90 минут	внутривенно
1, 15	Кальция фолинат	400	0,9% NaCl	250 мл	2 часа	внутривенно
1, 15	Флюороурацил	400	-	0	Болюс	внутривенно
1, 15	Флюороурацил	2400	0,9% NaCl	500 мл	46 часов	внутривенно
1, 8, 15, 22	Цетуксимаб	250	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Иринотекан</b>																												
■														■														
<b>Кальция фолинат</b>																												
■														■														
<b>Флюороурацил</b>																												
■														■														
<b>Флюороурацил</b>																												
■														■														
<b>Цетуксимаб</b>																												
■							■							■								■						

### Дополнительная информация

#### Примечание:

(\*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.

5FU можно вводить при помощи инфузионного насоса амбулаторно.

(\*) Цетуксимаб: Первое введение - в течение 120 минут в дозе 400 мг/м<sup>2</sup> до начала химиотерапии.

Альтернативно можно назначать Цетуксимаб (500 мг/м<sup>2</sup>) с возможными интервалами в 2 недели (Yuan et al., JCO 27, 2009 suppl, abstr. e15018).

Внимание! Иринотекан может вызвать опасную для жизни диарею и холинергический синдром. Диарея может возникнуть либо в острой форме, либо в некоторые дни после введения Иринотекана.

Сопутствующая медикация: Атропин 0,2 мг подкожно или внутривенно.

В случае диареи: Лоперамид, сначала 4 мг, затем по 2 мг каждые 2 часа. Прием Лоперамида следует продолжать еще в течение 12 часов после прекращения диареи. Если она сохраняется более 48 часов или в случае лихорадки, рекомендовано назначение Ципрофлоксацина и госпитализация.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

#### Литература:

Van Cutsem E. et al., N Engl J Med 360: 1408ff, 2009.

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

