

## 5FU / Лейковорин / Оксалиплатин (FOLFOX IV) XC588 (европейский протокол) Колоректальный рак

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 15	Кальция фолинат	400	0,9% NaCl	250 мл	2 часа	внутривенно
1, 15	Оксалиплатин	100	5% Глюкоза	500 мл	2 часа	внутривенно
1, 15	Флюороурацил	400	-	0	Болюс	внутривенно
1, 15	Флюороурацил	2400	0,9% NaCl	500 мл	44 часа	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Кальция фолинат</b>																												
■														■														
<b>Оксалиплатин</b>																												
■														■														
<b>Флюороурацил</b>																												
■														■														
<b>Флюороурацил</b>																												
■														■														

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

(\*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом. 5FU можно вводить при помощи инфузионного насоса амбулаторно.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

#### Литература:

Maindrault-Goebel F. et al., Eur J Cancer 35: 1338ff, 1999.

