

## Иринотекан (еженедельно) (европейский протокол) Колоректальный рак

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15, 22	Иринотекан	125	0,9% NaCl	250 мл	90 минут	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Иринотекан																																

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
36 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
4

#### Примечание:

**Внимание!** Иринотекан может вызвать опасную для жизни диарею и холинергический синдром. Диарея может возникнуть либо в острой форме, либо в некоторые дни после введения Иринотекана.

**Сопутствующая медикация:** Атропин 0,2 мг подкожно или внутривенно.

**В случае диареи:** Лоперамид, сначала 4 мг, затем по 2 мг каждые 2 часа. Прием Лоперамида следует продолжать еще в течение 12 часов после прекращения диареи. Если она сохраняется более 48 часов или в случае лихорадки, рекомендовано назначение Ципрофлоксацина и госпитализация.

**Авторы:** [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

**Последнее изменение содержания:** январь 2016 г.

#### Литература:

Saltz L.B. et al., N Engl J Med 343: 905ff, 2000.

