хемотека
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

# Иринотекан (еженедельно) (европейский протокол) Колоректальный рак

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м$^2$ | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 8, 15, 22 | Иринотекан | 125 | 0,9% NaCl | 250 мл | 90 минут | внутривенно |

**График введения препаратов:**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Иринотекан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Дополнительная информация**

**ПОВТОРНО НА:**
**36 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:**
**4**

**Примечание:**
**Внимание! Иринотекан может вызвать опасную для жизни диарею и холинергический синдром. Диарея может возникнуть либо в острой форме, либо в некоторые дни после введения Иринотекана.**
**Сопутствующая медикация: Атропин 0,2 мг подкожно или внутривенно.**
**В случае диареи: Лоперамид, сначала 4 мг, затем по 2 мг каждые 2 часа. Прием Лоперамида следует продолжать еще в течение 12 часов после прекращения диареи. Если она сохраняется более 48 часов или в случае лихорадки, рекомендовано назначение Ципрофлоксацина и госпитализация.**
**Авторы: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).**
**Последнее изменение содержания: январь 2016 г.**
**Литература:**
**Saltz L.B. et al., N Engl J Med 343: 905ff, 2000.**