

## Иринотекан / Цетуксимаб ХС660 + ХА070 (европейский протокол) Колоректальный рак

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1	Иринотекан	125	0,9% NaCl	500	1 час	внутривенно
1	Цетуксимаб	250	0,9% NaCl	500	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Иринотекан</b>																												
<b>Цетуксимаб</b>																												

### Дополнительная информация

#### Примечание:

**Внимание!** Иринотекан может вызвать опасную для жизни диарею и холинергический синдром. Диарея может возникнуть либо в острой форме, либо в некоторые дни после введения Иринотекана.

**Сопутствующая медикация:** Атропин 0,2 мг подкожно или внутривенно.

**В случае диареи:** Лоперамид, сначала 4 мг, затем по 2 мг каждые 2 часа. Прием Лоперамида следует продолжать еще в течение 12 часов после прекращения диареи. Если она сохраняется более 48 часов или в случае лихорадки, рекомендовано назначение Ципрофлоксацина и госпитализация.

**(\*) Цетуксимаб:** Первое введение - в течение 120 минут в дозе 400 мг/м<sup>2</sup> до начала химиотерапии. В случае хорошей переносимости последующие дозы можно вводить в течение 60 минут. Обязательный перерыв в течение часа между Цетуксимабом и другими химиотерапевтическими веществами.

Альтернативно можно назначать Цетуксимаб (500 мг/м<sup>2</sup>) с возможными интервалами в 2 недели (Yuan et al., JCO 27, 2009 suppl, abstr. e15018).

#### Литература:

Cunningham D. et al., N Engl J Med 351: 337ff, 2004.

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

