

HD 5FU (изменена в соответствии с режимом Ardalan) XA149 (европейский протокол) Колоректальный рак

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15, 22, 29, 36	Кальция фолинат	500	0,9% NaCl	250 мл	2 часа	внутривенно
1, 8, 15, 22, 29, 36	Флюороурацил	2600	0,9% NaCl	1000 мл	22 часа	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Кальция фолинат																															
■							■							■							■								■		
Флюороурацил																															
■							■							■							■								■		

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
50 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Количество циклов: в случае хорошей переносимости продолжать в течение всего заболевания.

(*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Weh H.J. et al., Ann Oncol 5: 233ff, 1994.

