

HD 5FU (изменена в соответствии с режимом Ardalan) XA149 (европейский протокол) Колоректальный рак

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м ² | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|----------------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1, 8, 15, 22, 29, 36 | Кальция фолинат | 500 | 0,9% NaCl | 250 мл | 2 часа | внутривенно |
| 1, 8, 15, 22, 29, 36 | Флюороурацил | 2600 | 0,9% NaCl | 1000 мл | 22 часа | внутривенно |

График введения препаратов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Кальция фолинат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | | ■ | | |
| Флюороурацил | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | | ■ | | |

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
50 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Количество циклов: в случае хорошей переносимости продолжать в течение всего заболевания.

(*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Weh H.J. et al., Ann Oncol 5: 233ff, 1994.

