ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

HD 5FU (изменена в соответствии с режимом Ardalan) XA149 (европейский протокол) Колоректальный рак

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15, 22, 29, 36	Кальция фолинат	500	0,9% NaCl	250	2 часа	внутривенно
1, 8, 15, 22, 29, 36	Флюороурацил	2600	0,9% NaCl	1000	22 часа	внутривенно

График введения препаратов:

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
50 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:
Количество циклов: в случае хорошей переносимости продолжать в течение всего заболевания.
(*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.
Литература:
Weh H.J. et al., Ann Oncol 5: 233ff, 1994.