

## Капецитабин ХА149 (европейский протокол) Колоректальный рак

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м <sup>2</sup> | Растворитель | Объем (мл) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 1-14        | Капецитабин            | 2500                         | -            | 0          | -              | перорально    |

### График введения препаратов:

| 1           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Капецитабин |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

Количество циклов: в случае хорошей переносимости продолжать в течение всего заболевания.

2500 мг/м<sup>2</sup> разделяют на 2 равные дозы - утреннюю и вечернюю, через 30 минут после приема пищи.

#### Обратите внимание!

• Капецитабин (Capecitabini). Капсулы.  
Дозировки ЦПФ «Хемотека»: 150 мг, 250 мг, 500 мг. Количество капсул в упаковке: 60 шт., 120 шт. Возможно изготовление индивидуального количества капсул в упаковке.

#### Литература:

Twelves C. et al., Eur J Cancer 37: 597ff, 2001.

