

Капецитабин / Оксалиплатин ХС752 (европейский протокол) Колоректальный рак

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м ² | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1-14 | Капецитабин | 2000 | - | 0 | - | перорально |
| 1, 8 | Оксалиплатин | 70 | 5% Глюкоза | 500 мл | 2 часа | внутривенно |

График введения препаратов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Капецитабин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Оксалиплатин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
8

Примечание:

2000 мг/м² Капецитабина разделяют на 2 равные дозы - утреннюю и вечернюю, через 30 минут после приема пищи.

В качестве адъювантной терапии, Оксалиплатин назначают в дозе 130 мг/2 в первые сутки (повторно на 22 сутки), а доза и схема приема Капецитабина сохраняется на уровне 2000 мг/м². (Количество циклов: 8).

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Porschen R. et al., J Clin Oncol 25: 421ff, 2007; (Haller D. et al., J Clin Oncol 29: 1465ff, 2011).

