chemoteka.com



Митомицин / 5FU + RT XA149 (европейский протокол) Рак анального канала

Дни терапии	Лекарствен ное средство	Дозировка, мг/м²	Растворите ль	Объем (мл/ шт)	Время введения	Путь введения		
1	Митомицин	12	-	0	Болюс	внутривенно		
1-5, 24-28	Флюороурац ил	750	0,9% NaCl	1000 мл	24 часа	внутривенно		

График введения препаратов:

_	-						_		-																					
1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Митомицин																														
Флюороурацил																														

Дополнительная информация

повторно на: **31 (день)**

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:

Примечание:

Повторно: не назначается!

Непрерывная инфузия 5FU в течение первой и

последней недели радиотерапии.

Авторы: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е

издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016

г.

Литература:

UKCCCR Anal Cancer Trial Working Party, Lancet 348: 1049ff, 1996; Bartelink H. et al., J Clin Oncol 15: 2040ff, 1997.

