

## Митомицин / 5FU + RT ХА149 (европейский протокол) Рак анального канала

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Митомицин	12	-	0	Болюс	внутривенно
1-5, 24-28	Флюороурацил	750	0,9% NaCl	1000 мл	24 часа	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>Митомицин</b>																															
<b>Флюороурацил</b>																															

### Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:  
31 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
1**

**Примечание:**

**Повторно: не назначается!**

**Непрерывная инфузия 5FU в течение первой и последней недели радиотерапии.**

**Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).**

**Последнее изменение содержания: январь 2016 г.**

**Литература:**

**UKCCCR Anal Cancer Trial Working Party, Lancet 348: 1049ff, 1996; Bartelink H. et al., J Clin Oncol 15: 2040ff, 1997.**

