

## Доцетаксел / Цисплатин ХС292 (европейский протокол) Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Доцетаксел	75	0,9% NaCl	250 мл	1 час	внутривенно
1	Цисплатин	75	0,9% NaCl	1000 мл	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Доцетаксел</b>																					
<b>Цисплатин</b>																					

### Дополнительная информация

#### Примечание:

Доцетаксел разводят до 0,3-0,74 мг/мл.  
Сопутствующая медикация: Дексаметазон 8 мг орально 2 раза в день в течение 3 суток, начиная в 1 день перед приемом Доцетаксела.  
Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):  
Сопутствующая медикация:  
Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO4 внутривенно в течение 60 мин.  
200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.  
Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.  
Авторы: [Thomas Kühn](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).  
Последнее изменение содержания: январь 2016 г.  
Литература:  
Zalberg J. et al., J Clin Oncol 16: 1948ff, 1998.

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

