

Цисплатин / 5FU ХС284 (европейский протокол) Рак головы и шеи

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-5	Флюороурацил	1000	0,9% NaCl	1000 мл	24 часа	внутривенно
1	Цисплатин	100	0,9% NaCl	1000 мл	4 часа	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Флюороурацил																												
Цисплатин																												

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
29 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6**

Примечание:

Цисплатин (только если СКФ ≥ 60 мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO₄ внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Lefebvre J.L. et al., J Nat Cancer Inst 88: 890ff, 1996.

