

## Цисплатин / 5FU + Цетуксимаб ХА284 + ХА070 (сутки 1), ХА070 (сутки 8, 15) (европейский протокол) Рак головы и шеи

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1-4	Флюороурацил	1000	0,9% NaCl	1000	22 часа	внутривенно
1, 8, 15	Цетуксимаб	250	0,9% NaCl	500	1 час	внутривенно
1	Цисплатин	100	0,9% NaCl	500	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Флюороурацил</b>																					
■	■	■	■																		
<b>Цетуксимаб</b>																					
■							■							■							
<b>Цисплатин</b>																					
■																					

### Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:  
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6**

#### Примечание:

**Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):**

**Сопутствующая медикация:**

**Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO4 внутривенно в течение 60 мин.**

**200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.**

**Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.**

**(\*) Цетуксимаб: Первое введение в течение 120 минут.**

**В случае хорошей переносимости последующие дозы можно вводить в течение 60 минут. Обязательный перерыв в течение часа между Цетуксимабом и другими химиотерапевтическими веществами.**

**Литература:**

**Vermorken J.B. et al., N Engl J Med 359: 1116ff, 2008.**

