

## Карбоплатин / Этопозид ХС192 (европейский протокол) Остеосаркома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-4	Карбоплатин	150	5% Глюкоза	500 мл	1 час	внутривенно
1-4	Этопозид	150	0,9% NaCl	1000 мл	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Карбоплатин</b>																					
<b>Этопозид</b>																					

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

Если общая доза составляет  $\geq 200$  мг, Этопозид растворяют в 1000 мл 0,9% раствора NaCl.

**Расчет дозы Карбоплатина (формула Calvert):**

**Доза (мг) = целевая AUC x (СКФ + 25).**

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016.

Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Winkler K. et al., Cancer Treat Res 62: 269, 1993.

