

**ЕВАІА ХС512 (сутки 1-3), ХС516 (сутки 21-23) (европейский протокол) Саркома Юинга, ПНЭО**

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
22-24	Актиномицин D	0,5**	-	0	Болюс	внутривенно
1, 22	Винкристин	1,5(*)	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно
1-3	Доксорубицин	20	0,9% NaCl	250 мл	4 часа	внутривенно
1-3, 22-24	Ифосфамид	2000	0,9% NaCl	1000 мл	1 час	внутривенно
1-4, 22-25	Месна	2000	0,9% NaCl	500 мл	24 часа	внутривенно
1-3, 22-24	Этопозид	150	0,9% NaCl	1000 мл	1 час	внутривенно

**График введения препаратов:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
<b>Актиномицин D</b>																																		
<b>Винкристин</b>																																		
<b>Доксорубицин</b>																																		
<b>Ифосфамид</b>																																		
<b>Месна</b>																																		
<b>Этопозид</b>																																		

**Дополнительная информация**

ПОВТОРНО НА:  
43 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
2

**Примечание:**

Если общая доза составляет  $\geq 200$  мг, Этопозид растворяют в 1000 мл 0,9% раствора NaCl.

(\*) Винкристин, макс. количество доз - 2 мг.

(\*\*) Актиномицин D, макс. кол-во доз - 1 мг.

Внимание! Доксорубицин может быть кардиотоксическим при общей дозе  $\geq 500$  мг/м<sup>2</sup>.

Месна: 20% дозы Ифосфамида, через 0, 4, 8 часов после приема Ифосфамида. Обратите внимание!

Месна (Mesna). Производится ЦПФ «Хемотека» только в стеклянных флаконах. Минимальный заказ - от 15 флаконов. Возможно приготовление в дозах 300-2000 мг во флаконе.

Авторы: **Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler** (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

**Литература:**

Schmoll H.-J. et al., *Kompendium Internistische Oncology*, Springer, S. 2128, 1999.

