ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

EVAIA XC512 (сутки 1-3), XC516 (сутки 21-23) (европейский протокол) Саркома Юинга, ПНЭО

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
22-24	Актиномицин D	0,5**	-	0	Болюс	внутривенно
1, 22	Винкристин	1,5(*)	0,9% NaCl	100	10 минут	внутривенно
1-3	Доксорубицин	20	0,9% NaCl	250	4 часа	внутривенно
1-3, 22-24	Ифосфамид	2000	0,9% NaCl	1000	1 час	внутривенно
1-4, 22-25	Месна	2000	0,9% NaCl	500	24 часа	внутривенно
1-3, 22-24	Этопозид	150	0,9% NaCl	1000	1 час	внутривенно

График введения препаратов:



Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
43 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
2

Примечание:
Если общая доза составляет ≥200 мг, Этопозид растворяют в 1000 мл 0,9% раствора NaCl.
(*) Винкристин, макс. количество доз - 2 мг.
(**) Актиномицин D, макс. кол-во доз - 1 мг.
Внимание! Доксорубицин может быть кардиотоксическим при общей дозе ≥500 мг/м2.
Месна: 20% дозы Ифосфамида, через 0, 4, 8 часов после приема Ифосфамида. Обратите внимание!
Месна (Mesna). Производится ЦПФ «Хемотека» только в стеклянных флаконах. Минимальный заказ – от 15 флаконов. Возможно приготовление в дозах 300-2000 мг во флаконе.
Литература:
Schmoll H.-J. et al., Kompendium Internistische Oncology, Springer, S. 2128, 1999.