ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

EVAIA XC512 (сутки 1-3), XC516 (сутки 21-23) (европейский протокол) Саркома Юинга, ПНЭО

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
22-24	Актиномицин D	0,5**	-	0	Болюс	внутривенно
1, 22	Винкристин	1,5(*)	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно
1-3	Доксорубицин	20	0,9% NaCl	250 мл	4 часа	внутривенно
1-3, 22-24	Ифосфамид	2000	0,9% NaCl	1000 мл	1 час	внутривенно
1-4, 22-25	Месна	2000	0,9% NaCl	500 мл	24 часа	внутривенно
1-3, 22-24	Этопозид	150	0,9% NaCl	1000 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:



Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
43 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
2

Примечание:
Если общая доза составляет ≥200 мг, Этопозид растворяют в 1000 мл 0,9% раствора NaCl.
(*) Винкристин, макс. количество доз - 2 мг.
(**) Актиномицин D, макс. кол-во доз - 1 мг.
Внимание! Доксорубицин может быть кардиотоксическим при общей дозе ≥500 мг/м2.
Месна: 20% дозы Ифосфамида, через 0, 4, 8 часов после приема Ифосфамида.
Обратите внимание!
Месна (Mesna). Производится ЦПФ «Хемотека» только в стеклянных флаконах. Минимальный заказ – от 15 флаконов. Возможно приготовление в дозах 300-2000 мг во флаконе.
Авторы: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).
Последнее изменение содержания: январь 2016 г.
Литература:
Schmoll H.-J. et al., Kompendium Internistische Oncology, Springer, S. 2128, 1999.