



## Ифосфамид / Доксорубицин (EORTC) XC448 (европейский протокол) Саркома мягких тканей

Дни терапии	Лекарствен ное средство	Дозировка, мг/м²	Растворите ль	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения	
1	Доксорубиц ин	75	0,9% NaCl	250 мл	1 час	внутривенно	
1	Ифосфамид	5000	0,9% NaCl	500 мл	24 часа	внутривенно	

## График введения препаратов:

1	2	3	4	2	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Дон	Доксорубицин																				
Ифосфамид																					

## Дополнительная информация

повторно на: **22 (день)** 

количество циклов: 6



Месна: 20% дозы Ифосфамида, через 0, 4, 8 ч после приема Ифосфамида (перорально или внутривенно).

Повышенный риск токсичности для ЦНС, если альбумин ≤3.5 г/дл.

Внимание! Доксорубицин может быть кардиотоксическим при общей дозе ≥500 мг/м2.

Авторы: <u>Thomas Kühr</u>, <u>Ewald Wöll</u>, <u>Josef Thaler</u> (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

## Литература:

Santoro A. et al., J Clin Oncol 13: 1537ff, 1995.

