

Эпирубицин / Ифосфамид ХС476 (европейский протокол) Саркома мягких тканей

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-5	Ифосфамид	1800	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно
1, 2	Эпирубицин	60	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ифосфамид																					
■	■	■	■	■																	
Эпирубицин																					
■	■																				

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
5**

Примечание:

Внимание! Эпирубицин может быть кардиотоксичным при общей дозе ≥ 1000 мг/м².
Месна: 20% дозы Ифосфамида, через 0, 4, 8 ч после приема Ифосфамида (перорально или внутривенно).

Повышенный риск токсичности для ЦНС, если альбумин ≤ 3.5 г/дл.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Frustaci S. et al., J Clin Oncol 19: 1238ff, 2001.

