

## Эпирубицин / Ифосфамид ХС476 (европейский протокол) Саркома мягких тканей

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-5	Ифосфамид	1800	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно
1, 2	Эпирубицин	60	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Ифосфамид</b>																					
■	■	■	■	■																	
<b>Эпирубицин</b>																					
■	■																				

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
5

#### Примечание:

**Внимание!** Эпирубицин может быть кардиотоксичным при общей дозе  $\geq 1000$  мг/м<sup>2</sup>.  
Месна: 20% дозы Ифосфамида, через 0, 4, 8 ч после приема Ифосфамида (перорально или внутривенно).

Повышенный риск токсичности для ЦНС, если альбумин  $\leq 3.5$  г/дл.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)  
(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

#### Литература:

Frustaci S. et al., J Clin Oncol 19: 1238ff, 2001.

