

СУВАДИС (ЕОРТС) ХС376 (европейский протокол) Саркома мягких тканей

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1, 5	Винкрестин	1(*)	0,9% NaCl	100	10 минут	внутривенно
1-5	Дакарбазин	250	0,9% NaCl	500	1 час	внутривенно
1	Доксорубицин	50	0,9% NaCl	250	1 час	внутривенно
1	Циклофосфамид	500	0,9% NaCl	250	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Винкрестин																					
■				■																	
Дакарбазин																					
■	■	■	■	■																	
Доксорубицин																					
■																					
Циклофосфамид																					
■																					

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Месна: 20% дозы Циклофосфамида, через 0, 4, 8 ч после приема Циклофосфамида (перорально или внутривенно).

(*) Винкрестин, макс. 2 мг.

Внимание! Доксорубицин может быть кардиотоксическим при общей дозе ≥500 мг/м².

Литература:

Gottlieb J.A. et al., Cancer Chemother Res 58: 265ff, 1974.

