

## СУВАДИС (ЕОРТС) ХС376 (европейский протокол) Саркома мягких тканей

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1, 5	Винкрестин	1(*)	0,9% NaCl	100	10 минут	внутривенно
1-5	Дакарбазин	250	0,9% NaCl	500	1 час	внутривенно
1	Доксорубицин	50	0,9% NaCl	250	1 час	внутривенно
1	Циклофосфамид	500	0,9% NaCl	250	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Винкрестин</b>																					
■				■																	
<b>Дакарбазин</b>																					
■	■	■	■	■																	
<b>Доксорубицин</b>																					
■																					
<b>Циклофосфамид</b>																					
■																					

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

Месна: 20% дозы Циклофосфамида, через 0, 4, 8 ч после приема Циклофосфамида (перорально или внутривенно).

(\*) Винкрестин, макс. 2 мг.

Внимание! Доксорубицин может быть кардиотоксическим при общей дозе  $\geq 500$  мг/м<sup>2</sup>.

#### Литература:

Gottlieb J.A. et al., Cancer Chemother Res 58: 265ff, 1974.

