

MAID ХС444 (европейский протокол) Саркома мягких тканей

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1-3	Дакарбазин	300	0,9% NaCl	500	24 часа	внутривенно
1-3	Доксорубицин	20	0,9% NaCl	500	24 часа	внутривенно
1-3	Ифосфамид	2500	0,9% NaCl	1000	24 часа	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Дакарбазин																					
Доксорубицин																					
Ифосфамид																					

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Месна: 20% дозы Ифосфамида, через 0, 4, 8 ч после приема Ифосфамида (перорально или внутривенно).

Повышенный риск токсичности для ЦНС, если альбумин ≤ 3.5 г/дл.

Внимание! Доксорубицин может быть кардиотоксическим при общей дозе ≥ 500 мг/м².

Дакарбазин: обязательно инфузионная система в светонепроницаемых контейнерах.

Литература:

Elias A. et al., J Clin Oncol 7: 1208ff, 1989.

