

## MAID ХС444 (европейский протокол) Саркома мягких тканей

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-3	Дакарбазин	300	0,9% NaCl	500 мл	24 часа	внутривенно
1-3	Доксорубицин	20	0,9% NaCl	500 мл	24 часа	внутривенно
1-3	Ифосфамид	2500	0,9% NaCl	1000 мл	24 часа	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Дакарбазин</b>																					
<b>Доксорубицин</b>																					
<b>Ифосфамид</b>																					

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

Месна: 20% дозы Ифосфамида, через 0, 4, 8 ч после приема Ифосфамида (перорально или внутривенно). Повышенный риск токсичности для ЦНС, если альбумин  $\leq 3.5$  г/дл.

Внимание! Доксорубицин может быть кардиотоксическим при общей дозе  $\geq 500$  мг/м<sup>2</sup>. Дакарбазин: обязательно инфузионная система в светонепроницаемых контейнерах.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г. Литература:

Elias A. et al., J Clin Oncol 7: 1208ff, 1989.

