

СНОР + Ритуксимаб ХС264 + ХА090 (европейский протокол) НХЛ острая

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1	Винкрестин	1,4(*)	0,9% NaCl	500	1 минут	внутривенно
1	Доксорубицин	50	0,9% NaCl	250	1 час	внутривенно
1	Преднизон	40	-	0	-	перорально
1-5	Ритуксимаб	375	0,9% NaCl	500	5 часов(3 часа)	внутривенно
1	Циклофосфамид	750	0,9% NaCl	500	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Винкрестин																					
Доксорубицин																					
Преднизон																					
Ритуксимаб																					
Циклофосфамид																					

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
2

Примечание:

Ритуксимаб: Начальная скорость инфузий - 50 мг/ч; через 30 минут ее можно увеличивать на 50 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч. Дальнейшие дозы вводятся на начальной скорости 100 и увеличиваются на 100 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч. Рекомендована премедикация - 30 мг Дифенгидрамина.
(*) Винкрестин, макс. 2 мг.

Внимание! Доксорубицин может быть кардиотоксическим при общей дозе ≥ 500 мг/м².

Месна: 20% дозы Циклофосфамида, через 0, 4, 8 ч после приема Циклофосфамида (перорально или внутривенно).

Литература:

Coiffier B. et al., N Engl J Med 346: 235ff, 2002.

