

## СНОР + Ритуксимаб ХС264 + ХА090 (европейский протокол) НХЛ острая

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Винкрестин	1,4(*)	0,9% NaCl	500 мл	1 минут	внутривенно
1	Доксорубин	50	0,9% NaCl	250 мл	1 час	внутривенно
1-5	Преднизон	40	-	0	-	перорально
1	Ритуксимаб	375	0,9% NaCl	500 мл	5 часов(3 часа)	внутривенно
1	Циклофосфамид	750	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Винкрестин</b>																					
■																					
<b>Доксорубин</b>																					
■																					
<b>Преднизон</b>																					
■	■	■	■	■																	
<b>Ритуксимаб</b>																					
■																					
<b>Циклофосфамид</b>																					
■																					

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
2

#### Примечание:

**Ритуксимаб:** Начальная скорость инфузий - 50 мг/ч; через 30 минут ее можно увеличивать на 50 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч. Дальнейшие дозы вводятся на начальной скорости 100 и увеличиваются на 100 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч. Рекомендована премедикация - 30 мг Дифенгидрамина.

(\*) Винкрестин, макс. 2 мг.

**Внимание!** Доксорубин может быть кардиотоксическим при общей дозе  $\geq 500$  мг/м<sup>2</sup>.

**Месна:** 20% дозы Циклофосфамида, через 0, 4, 8 ч после приема Циклофосфамида (перорально или внутривенно).

**Авторы:** [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

**Литература:**

Coiffier B. et al., N Engl J Med 346: 235ff, 2002.

