

Фотемустин ХС564 (европейський протокол) Меланома

Дни терапії	Лекарственне средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15	Фотемустин	100	5% Глюкоза	500	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Фотемустин																												
■							■							■														

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
3

Внимание! Схема Фотемустин ХС564 состоит из двух этапов - индукция (этап 1) и консолидация (этап 2). Схема лечения оценивается только при прохождении двух этапов.

Количество циклов: См. Примечание.

Примечание:

* После индуктивной фазы (сутки 1, 8, 15), начинается фаза консолидации (начало: 29-43 сутки); Фотемустин 100 мг/м² назначается только один раз в три недели.

Количество циклов определяется по уровню ответа (во время прогрессирования заболевания) или до наступления высокой гемотоксичности.

Фотемустин запрещается хранить дольше 4 часов при комнатной температуре.

(Внимание! Необходимо обеспечить полную защиту от попадания света).

Литература:

Jacquillat C. et al., Cancer 66: 1837ff, 1990.

