

## Фотемустин ХС564 (европейський протокол) Меланома

Дни терапії	Лекарственне средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15	Фотемустин	100	5% Глюкоза	500	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Фотемустин</b>																												
■							■							■														

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
3

**Внимание!** Схема Фотемустин ХС564 состоит из двух этапов - индукция (этап 1) и консолидация (этап 2). Схема лечения оценивается только при прохождении двух этапов.

Количество циклов: См. Примечание.

Примечание:

\* После индуктивной фазы (сутки 1, 8, 15), начинается фаза консолидации (начало: 29-43 сутки); Фотемустин 100 мг/м<sup>2</sup> назначается только один раз в три недели.

Количество циклов определяется по уровню ответа (во время прогрессирования заболевания) или до наступления высокой гемотоксичности.

Фотемустин запрещается хранить дольше 4 часов при комнатной температуре.

(Внимание! Необходимо обеспечить полную защиту от попадания света).

Литература:

Jacquillat C. et al., Cancer 66: 1837ff, 1990.

