

## Ипилимумаб / Ниволумаб ХА074 (европейский протокол) Меланома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Ипилимумаб	3 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	90 минут	внутривенно
1	Ниволумаб	1 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Ипилимумаб</b>																					
<b>Ниволумаб</b>																					

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
4

#### Примечание:

Ниволумаб разводят до 1,0-10,0 мг/мл.

Ипилимаб разводят до 1,0-4,0 мг/мл.

Авторы: [Thomas Kühn](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

#### Литература:

Larkin J. et al., N Engl J Med 373: 23ff, 2015;

Postow M.A. et al., N Engl J Med 372: 2006ff, 2015.

