

СОМР Ритуксимаб ХС346 + ХА09 (европейский протокол) НХЛ острая

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1	Винкристин	1,4(*)	0,9% NaCl	100	10 минут	внутривенно
1	Липосомный комплекс доксорубицина цитрата	50	0,9% NaCl	100	1 час	внутривенно
1	Преднизон	40	-	0	-	перорально
1-5	Ритуксимаб	375	0,9% NaCl	500	5 часов (3 часа)	перорально
1	Циклофосфамид	750	0,9% NaCl	500	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Винкристин																					
Липосомный комплекс доксорубицина цитрата																					
Преднизон																					
Ритуксимаб																					
Циклофосфамид																					

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
8

Примечание:

Ритуксимаб: Начальная скорость инфузий - 50 мг/ч; через 30 минут ее можно увеличивать на 50 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч. Дальнейшие дозы вводятся на начальной скорости 100 и увеличиваются на 100 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч. Рекомендована премедикация - 30 мг Дифенгидрамина. Липосомальный комплекс доксорубицина цитрата разводят до 0,4-1,2 мг/мл.

(*) Винкристин, макс. 2 мг.

Месна: 20% дозы Циклофосфамида, через 0, 4, 8 ч после приема Циклофосфамида (перорально или внутривенно).

Литература:

Luminari S. et al., Ann Oncol 21: 1492ff, 2010.

