

## Сорафениб (европейский протокол) Рак щитовидной железы

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м <sup>2</sup> | Растворитель | Объем (мл) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 1-30        | Сорафениб              | 800 (const)                  | -            | 0          | -              | перорально    |

### График введения препаратов:

| 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Сорафениб                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| [График приема препарата] |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
31 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
постоянный прием

#### Примечание:

800 мг разделить на 2 равные дозы - утреннюю и вечернюю.

#### Литература:

Brose M.S. et al., J Clin Oncol 31, 2013 (suppl; abstr 4).

