

Сунитиниб ХА149 (европейский протокол) Рак почки

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-28	Сунитиниб	2 x 12,5	-	56 шт	-	перорально

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Сунитиниб																														

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
43 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Количество циклов: пока прогрессирует заболевание.

Внимание! Гипотиреоз.

Сунитиниб также можно принимать постоянно в суточной дозе 37,5 мг (Escudier B. et al., J Clin Oncol 27: 4068ff, 2009).

Авторы: [Thomas Kühn](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Motzer R.J. et al., N Engl J Med 356: 115ff, 2007;
Motzer R.J. et al., J Clin Oncol 27: 3584ff, 2009.

