

Сорафениб ХА149 (европейский протокол) Рак почки

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м ² | Растворитель | Объем (мл) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 1-30 | Сорафениб | 800 (const) | - | 0 | - | перорально |

График введения препаратов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Сорафениб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [График приема препарата] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
31 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
постоянный прием

Примечание:

800 мг разделить на 2 равные дозы - утреннюю и вечернюю.

Литература:

Escudier B. et al., N Engl J Med 356: 125ff, 2007.

