

Интерферон альфа + Бевацизумаб ХА149 + ХА060 (европейский протокол) Рак почки

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1	Бевацизумаб	10 мг/кг	0,9% NaCl	100	90 минут	внутривенно
1, 3, 5, 8, 10, 12	Интерферон альфа	3 ММЕ (const)	-	0	-	подкожно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Бевацизумаб														
Интерферон альфа														

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
15 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
2**

Примечание:

Количество циклов: Интерферон альфа: макс. 52 недели или в течение всей болезни; Бевацизумаб: во время всей болезни.

(*) Бевацизумаб: Начальную дозу вводят в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии, вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.

По результатам ретроспективного анализа, дозу ИФН корректируют до 6 ММЕ (61% пациентов) или до 3 ММЕ (31% пациентов) без потери эффективности.

Литература:

Escudier B. et al., Lancet 370: 210ff, 2007; Melichar B. et al., Ann Oncol 19: 1470ff, 2008.

