

## Интерферон альфа + Бевацизумаб ХА149 + ХА060 (европейский протокол) Рак почки

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Бевацизумаб	10 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	90 минут	внутривенно
1, 3, 5, 8, 10, 12	Интерферон альфа	3 ММЕ (const)	-	0	-	подкожно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Бевацизумаб</b>														
<b>Интерферон альфа</b>														

### Дополнительная информация

#### Примечание:

Количество циклов: Интерферон альфа: макс. 52 недели или в течение всей болезни; Бевацизумаб: во время всей болезни.

(\*) Бевацизумаб: Начальную дозу вводят в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии, вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.

По результатам ретроспективного анализа, дозу ИФН корректируют до 6 ММЕ (61% пациентов) или до 3 ММЕ (31% пациентов) без потери эффективности.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

#### Литература:

Escudier B. et al., Lancet 370: 210ff, 2007; Melichar B. et al., Ann Oncol 19: 1470ff, 2008.

ПОВТОРНО НА:  
15 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
2

